
*Consommation d'alcool et
intoxications aiguës chez les
jeunes et dans la population
suisse en général*

Hervé Kuendig & Marina Delgrande Jordan

sfa / ispa 

***Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA), Lausanne***

Les conséquences de la consommation d'alcool varient en fonction du type de consommation prédominant dans une société

Sources de données pour la Suisse?

Enquête sur la santé des élèves:

**Health Behaviour in School-Aged Children
(HBSC)**

Enquête dans la population générale:


**Enquête suisse sur la santé
(ESS)**

Enquête sur la santé des élèves en 2006

- Etude internationale placée sous l'égide de l'OMS et à laquelle participent 41 pays
- Suisse: enquête représentative pour l'ensemble du pays
- Objectifs:
 - mieux connaître les comportements de santé et décrire leur évolution au cours du temps
 - fournir des bases pour la promotion de la santé
 - décrire l'évolution de la consommation de substances psychotropes
- Financement: Office fédéral de la santé publique, cantons, ISPA
- Réf.: Schmid, H., Delgrande Jordan, M., Kuntsche, E. N., Kuendig, H. & Annaheim, B. (2007). *Der Konsum psychoaktiver Substanzen von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz* (Forschungsbericht Nr. 42). Lausanne: SFA-ISPA.


Evolution de la consommation d'alcool chez les jeunes

Consommation hebdomadaire d'alcool en Suisse: 1986-2006




Motifs de cons. d'alcool

(chez les 15 ans)



Au moins 2 états d'ivresse



Tendances et particularités

- **25% des garçons et 17% des filles de 15 ans consomment de l'alcool chaque semaine.**
- **28% des garçons et 19% des filles de 15 ans rapportent des états d'ivresse multiples (≈44'000 jeunes de 11 à 15 ans).**
- **Après une augmentation importante en 2002, ces taux ont légèrement diminué en 2006.**
- **L'ivresse chez les jeunes est un thème largement évoqué dans les médias et au niveau politique. La prise de conscience de ce problème s'est accentuée chez les parents et les jeunes eux-mêmes. Protection de la jeunesse. Prix des alcopops.**


Et dans la population adulte?

L'Enquête Suisse sur la santé:


- Réalisée par l'office fédérale de la statistique
- ISPA mandaté pour l'analyse des données
- Quand ? 2002 (1997)
- Intoxication aiguë: 8+/6+ unités
- Consommateurs actuels seulement
- Réf.: Annaheim, B., & Gmel, G. (2004). Alkoholkonsum in der Schweiz: Ein Synthesebericht zu Alkoholkonsum und dessen Entwicklung auf der Basis der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 1997 und 2002 (Forschungsbericht). Lausanne: SFA/ISPA

ESS 2002: Intoxication aiguë

moins d'une fois par mois Vs. au moins une fois par mois




ESS 2002: Intoxication aiguë par groupes d'âge (au moins une fois par mois)



ESS: Evolution 1997 – 2002

(au moins une fois par mois)



Conséquences liées aux intoxications aiguës

- **Les conséquences de la consommation d'alcool varient en fonction du type de consommation prédominant dans une société**
- **Quel que soit le type de consommation prédominant dans une société, les blessures ou traumatismes intentionnels et non-intentionnels sont davantage liés à des intoxications aiguës occasionnelles qu'à une consommation régulière élevée:**
 - accidents de la circulation et autres accidents
 - lésions auto-infligées (suicide), violence

Exemple de conséquences liées aux intoxications aiguës :

**Risque de survenue de
traumatismes en lien avec une
consommation aiguë d'alcool**

Risque de survenue de traumatismes en lien à une consommation aiguë d'alcool

